

LA DESPARASITACIÓN DEL GANADO VACUNO

Uno de los mayores retos para los ganaderos es el control y prevención de parásitos que afectan directamente al ganado. Los parásitos en los bovinos pueden llegar a causar pérdidas económicas ya que esto influye directamente en su capacidad productiva. Pero principalmente, afectan a su salud produciendo lesiones, pérdidas de sangre y afecciones que ponen en riesgo su bienestar. La desparasitación es sin duda la mejor forma de prevenir enfermedades que afecten al ganado.

FACTORES PARA TENER EN CUENTA ANTES DE LA DESPARASITACIÓN

Para realizar una correcta desparasitación, es fundamental contar con la opinión de un profesional veterinario, que será el que dé las pautas sobre como proceder y cuál es el mejor método para realizar dicha tarea. ¿Qué se debe hacer?

Llevar a cabo un plan sanitario que establezca los periodos de vacunación del ganado de acuerdo con su edad. Aplicar las dosis recomendadas por el veterinario en función del peso de cada animal. Los terneros necesitarán de una desparasitación más frecuente hasta cumplidos los seis meses de edad. El ganado adulto será desparasitado en función de lo establecido por el personal veterinario.

PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS

En función de la ubicación en la que se encuentren dichos parásitos, se pueden clasificar en parásitos internos (endoparásitos) y parásitos externos (ectoparásitos). Los internos son aquellos que se localizan en el aparato digestivo, pulmones, sangre y tejidos del ganado. Mientras que los parásitos externos son los que se localizan en la superficie del animal. Estos parásitos necesitan completar su ciclo de vida para poder subsistir. Unas condiciones de temperatura y humedad apropiadas para su desarrollo serán necesarias para que adquieran la capacidad de infestar a sus huéspedes.

Los distintos tipos de parásitos internos y externos que se pueden encontrar en el ganado bovino y sus distintos niveles de infestación pueden variar en función de la especie del parásito en cuestión, las condiciones físicas y de nutrición del animal, la localización geográfica en la que habite, la época del año y las condiciones ambientales y de manejo que afecten directamente al estado fisiológico del animal.

DESPARASITACIÓN SISTEMÁTICA Y ESTRATÉGICA EN EL GANADO BOVINO

La desparasitación sistemática es un término que hace referencia a aquella desparasitación que se realiza en masa a todo el ganado en épocas del año determinadas. Teniendo en cuenta unas condiciones climatológicas concretas que son las que inciden directamente en el ciclo de vida de los parásitos que afectan al animal. La desparasitación sistemática tiene como desventaja el hecho de que no se tiene en cuenta las necesidades especiales que pueden tener algunos animales. Como ventaja, este tipo de desparasitación favorece un mejor manejo del ganado y una mejora en la administración de los gastos.

Por otra parte, la desparasitación estratégica atiende a las necesidades específicas del ganado y obtiene un mayor beneficio en función del momento en el que se aplique. Gracias a esta forma de desparasitación, se tiene un menor impacto sobre las cepas más resistentes.

La prevención es el primer paso en la erradicación de parásitos en el ganado vacuno. Por lo tanto, un calendario de vacunación y llevar a cabo las pautas establecidas por los veterinarios es imprescindible para garantizar la salud y el bienestar de los animales.

Texto: Consentidovacuno.es



Línea Gratuita:
800-2673