

# 6 Preguntas Frecuentes sobre el Gusano Barrenador del Ganado 2da. Parte

Agosto 2023

## 1. ¿Cuáles son las heridas que ataca el gusano barrenador?

R: Cualquier herida fresca como: arañazos, rasguños, mordidas de vampiros, picadura de garrapatas, etc.

- Mucosas de los orificios corporales como los ojos, la boca, la nariz, los genitales, ombligos de recién nacidos, entre otros.

- Prácticas ganaderas (heridas provocadas): descorne, castraciones, aplicación de aretes, ferrete, entre otras.

## 2. ¿Qué tratamientos hay para combatir el Gusano Barrenador?

R: Aplicación de larvicidas organofosforados, siempre siguiendo las recomendaciones de seguridad del fabricante. También es posible proteger al ganado mediante pulverizaciones o baños regulares con insecticidas, o mediante la aplicación de ivermectina y compuestos relacionados. Recuerde seguir las instrucciones del fabricante y su veterinario.

## 3. ¿A quién debo contactar si sospecho de contagio con Gusano Barrenador?

R: En el caso de animales: contacte al equipo de COPEG en su línea de emergencia (gratuita) 800-2673. También puede contactar al personal del MIDA o el veterinario más cercano.

## 4. ¿Cuál es la edad para hacer un descorne?

R: El descorne en animales debe realizarse durante los seis primeros meses para evitar heridas traumáticas y difíciles de cicatrizar en el animal. No se recomienda el descorne en adultos ya que deja una herida muy profunda, fuera de ser doloroso; si va a realizar un descorne en un animal adulto debe ser mediante cirugía y debe realizarlo un profesional idóneo.

## 5. ¿Sirve la ivermectina para tratar el Gusano Barrenador del Ganado?

R: Sirve como método de prevención antes de que el animal presente una gusanera, ya que después de su aplicación demora aproximadamente ocho días en hacer efecto. Si va a realizar un descorne, una castración u otra práctica sanitaria que pueda generar una herida y quiere utilizar ivermectina, debe aplicarla mínimo 8 días antes del procedimiento, recuerde siempre seguir las instrucciones del fabricante y las recomendaciones de su veterinario.

## 6. ¿El Gusano Barrenador y el Tórsalo son lo mismo?

R: No son el mismo gusano, son especies diferentes. Mientras que el tórsalo se alimenta de tejido muerto y crea un absceso o tumor con una abertura en la piel del animal para respirar, el gusano barrenador se alimenta de tejido vivo y crea una gran herida que bota sangre.



Tórsalo



Gusano Barrenador

Fuente: Departamento de Comunicación e Información



@COPEGAmerica



Línea Gratuita:  
800-2673