

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el impacto?

R: Una reinfestación de la plaga en América puede ocasionar pérdidas millonarias en ganado, embargos comerciales y trabajo de erradicación. Las mascotas, el ganado, la fauna silvestre e incluso las personas pueden sufrir y morir por la miasis de Gusano Barrenador del ganado.

¿Qué consecuencias tiene el GBG?

R: - Limitaciones para el comercio internacional

- Causa la muerte en siete a diez días posterior a la infestación en animales sin tratamiento por reinfestaciones, toxicidad o infecciones secundarias

- Deterioro de las pieles de los animales, en las pieles utilizadas como material de cuero produce daños por pérdidas de áreas útiles.

- Decomisos de zonas afectadas en mataderos.

- En cuanto a la salud del animal puede ocasionar fiebre, decaimiento, disminución del apetito (anorexia), dolor localizado en la zona afectadas, desasosiego, furúnculos, úlceras, infecciones importantes en terneros por entrada de bacterias a través del ombligo afectado por GBG, tales como la causante de la poliartritis bacteriana.

- Animales de producción de leche pueden bajar la producción láctea (infestaciones variadas o de gran magnitud).

- Animales productores de carne baja en ganancia de peso y/o en el peso alcanzado.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es la edad para hacer un descorne?

R: El descorne en animales debe realizarse durante los seis primeros meses para evitar heridas traumáticas y difíciles de cicatrizar en el animal.

¿Qué tratamientos hay para combatir el Gusano Barrenador?

R: Aplicación de larvicidas organofosforados, siempre siguiendo las recomendaciones de seguridad del fabricante.

¿A quién debo contactar si sospecho de contagio con Gusano Barrenador?

R: - En el caso de animales con gusaneras contacte al equipo de COPEG:



WhatsApp 6670 - 2164

Para recibir y atender denuncias de gusaneras (texto, video o audio)

LÍNEA DIRECTA: 800 - 2673

Panamá, Sede Central
296-0006

SIVET Oeste
6379-2934


Santa Fe, Darién
299-6358

Metetí, Darién
299-6354


Yaviza, Darién
299-4091

     @COPEGAmerica

www.copeg.org



¿Qué es el Gusano Barrenado del Ganado? (GBG)



COPEG

¿A QUIÉNES AFECTA EL GBG?

El Gusano Barrenador del Ganado es la larva de la mosca ***Cochliomyia hominivorax*** que afecta a los animales de sangre caliente, incluyendo a los seres humanos. Las larvas comúnmente entran a través de una herida como el ombligo en el caso de los recién nacidos.




Se alimentan del tejido vivo de los animales y pueden resultar mortales si no se tratan adecuadamente. Este problema puede surgir tanto por factores naturales como por prácticas ganaderas, y también puede afectar los orificios corporales del animal.

CICLO DE VIDA DE LA MOSCA DEL GUSANO BARRENADOR

El ciclo de vida de la mosca ***Cochliomyia hominivorax*** se inicia con el apareo de dos moscas adultas y fértiles (macho y hembra), después de un corto período la mosca hembra comienza a buscar una herida fresca en cualquier tipo de animal de sangre caliente, incluyendo los seres humanos, para depositar sus huevos.

La mosca hembra deposita sus huevos en la herida y de estos emergen las larvas que inmediatamente comienzan a alimentarse del tejido vivo, adentrándose en la herida. Una vez que las larvas se desarrollan, abandonan la herida y se dejan caer al suelo donde se entierran hasta llegar a la fase de pupa. La pupa se convierte en mosca adulta para iniciar nuevamente el ciclo de vida.



REFORZANDO LA VIGILANCIA EVITAMOS LAS GUSANERAS

1 REVISE FRECUENTEMENTE SUS ANIMALES.



2 CURE LAS HERIDAS DE SUS ANIMALES.



3 TOME Y ENVÍE MUESTRAS DE GUSANOS.



4 TRANSPORTE SOLO ANIMALES SANOS.

